

(1)

ଖମ୍ବ ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶୀ ଆଳୁ ବା ମାଟି ଆଳୁ କୁହାଯାଇଥାଏ । କନ୍ୟା ଫସଲ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶୀ ଆଳୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ । ଏଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ଭରି ରହିଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଚକ୍ର, ଶ୍ୱେତସାର, ଭିଟାମିନ୍ 'ଖ' ସହିତ ଧାତବ ଲବଣ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥାଏ । ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷିଭାଇମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଷଣ ଓ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ ।

ଜଳବାୟୁ ଓ ମୃତ୍ତିକା

ଦେଶୀ ଆଳୁ ଏକ ଲତା ଜାତୀୟ ଗୁଳ୍ମ । ଦେଶୀ ଆଳୁ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଓ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିବା ଜଳବାୟୁରେ ଅଧିକ ଅମଳ ଦେଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ବାର୍ଷିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ୧୨୦୦ ରୁ ୨୦୦୦ ମିଲି ମିଟର ବର୍ଷା ମାସରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ହେଲେ, ଏହି ଫସଲ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ । ବାଲିଆ, ଦୋରସା, ହାଲୁକା ଅଧିକ ଖତ ଥିବା ମାଟି ଦେଶୀ ଆଳୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ । ମାଟିର ଅମ୍ଳତା ୫ ରୁ ୭ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ଏବଂ ମାଟିରେ ଅଧିକ ପଟାସ ଥିଲେ ଏହି ଚାଷ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ।

ବିଭିନ୍ନ କିଷମ

ଶ୍ରୀରୂପା- ଅମଳ ଅବଧି ୯-୧୦ ମାସ । ୧୦-୧୨ ଚନ୍ / ଏକର ଅମଳ ମିଳିଥାଏ । ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଧଳା ଅଟେ ।

ଓଡ଼ିଶା ଲଲାଇଟ୍- ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଜଳ ସେଚିତ ଓ ବର୍ଷା ଜଳରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଜମିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ । ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ । ଏକର ପ୍ରତି ୧୦-୧୨ ଚନ୍ ଅମଳ ଦେଇଥାଏ ।

ଶ୍ରୀନିଧି - ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଜଳ ସେଚିତ ଓ ବର୍ଷା ଜଳରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଜମିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ । ଖାଇବାକୁ ଭଲ । ୧୨-୧୪ ଚନ୍ ଅମଳ ଦେଇଥାଏ ।

ଲଗାଇବା ସମୟ:

ମଇ ଠାରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ଦେଶୀ ଆଳୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଅଟେ । ଜଳ ସେଚନ ସୁବିଧା ଥିଲେ ଏହାକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇପାରେ ।

(2)

ଜମିପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଲଗାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ

ଦୋରସା, ବାଲିଆ ଦୋରସା ଓ ମଟାଳ ଦୋରସା ମାଟିରେ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଭଲ ବଢ଼ିଥାଏ । ଜମିକୁ ଭଲ ଭାବେ ହଳ କରି ଗୁଣ୍ଡ ଚାଷ କରାଯାଏ । ୯୦ ସେ.ମି X ୯୦ ସେ.ମି ବ୍ୟବଧାନରେ ହୁଡ଼ା ଓ ସିଆର ତିଆରି କରାଯାଏ ।

ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଳୁକୁ କାଟି ୪୦-୫୦ ଗ୍ରାମ୍ରେ କାଟି ବିହନ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ୧୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଣ୍ଡି ଖତରେ ବିଶୋଧନ କରାଯାଏ । ୨ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଇରେ ଶୁଖା ଯାଇଥାଏ । ଏକର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୫୦୦୦ ଖଣ୍ଡ ବିହନ ଦରକାର । ଏହାକୁ ହୁଡ଼ାରେ କିମ୍ବା କୁଦାରେ ଲଗାଯାଏ ।

ସାର ପରିଚାଳନା

୪-୫ ଚନ୍ ସତ୍ତା ଗୋବର ଖତକୁ ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ ବେଳେ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର । ୪୮ -୯୦-୧୨୦ କି.ଗ୍ରା ହିସାବରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ-ଫସ୍ଫରସ୍-ପୋଟାସ୍ ସାର ୧ ଏକର ପ୍ରତି ଦରକାର ହୋଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଫସ୍ଫରସ୍, ୫ କି.ଗ୍ରା ଚୋରାକ୍, ୩ କି.ଗ୍ରା ଜିଙ୍କ୍ ସଲ୍ଫେଟ୍, ୩ କି.ଗ୍ରା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସଲ୍ଫେଟ୍‌କୁ ଶେଷ ଓଡ଼ଚାଷ ପୂର୍ବରୁ ଖତ ସହ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ । ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଯବକ୍ଷାରଯାନ ଓ ପୋଟାସ ସାରକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଲଗାଇବାର ୩୦, ୬୦ ଓ ୯୦ ଦିନ କୋଡ଼ା ଖୁସା ପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମାଟି ଟେକି ଦେଲେ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ।

ଘାସ ପରିଚାଳନା

ଲଗାଇବାର ୩୦, ୬୦ ଓ ୯୦ ଦିନରେ କୋଡ଼ା ଖୁସାକରି ଘାସ ବାଛି ଦେବା ଦରକାର । ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୩ ମି.ଲି ପେଣ୍ଟିମେଥାଲିନ୍ ପରି ଘାସମରା ଔଷଧ, କନ୍ୟ ଲଗାଇବାର ୩ ରୁ ୪ ଦିନପରେ ମାଟି ବତର ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଅନେକାଂଶରେ ଘାସ ରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ ।

ଜଳସେଚନ ପରିଚାଳନା

ସାଧାରଣତଃ ଦେଶୀଆଳୁ ଶୁଖା ଓ ପାଣି ଅଭାବ ଜନିତ ମରୁଡ଼ି ସହଣୀ ଶକ୍ତି ଥାଏ । ଅଧିକ ପାଣି ଏହି ଫସଲ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ । କିନ୍ତୁ ଲଗାଇବାର ଆରମ୍ଭରେ ୧୦ ରୁ ୧୫ ଦିନ ଭିତରେ ବର୍ଷା ନହେଲେ ଜଳସେଚନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ । ଥରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆସିଲେ, ଏହି ଫସଲ ପାଇଁ ଆଉ ଜଳସେଚନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରୁହେ ନାହିଁ । ଅଧିକ ଜଳ ହେଲେ, ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ।

(3)

ରୋଗ ଓ ପୋକ ପରିଚଳନା

ରୋଗ

ଆକ୍ରାନ୍ତନୋକ୍: ଏକ କବକଜନିତ ରୋଗ, ଯାହା ଫଳରେ ପତ୍ରରେ ଦାଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଓ ଦାଗ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ଯାଇ ବାଦାମି ଓ କଳା ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ପତ୍ର ଝଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ନିମ୍ନ ତେଲ ୫ ମିଲି ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥାଏ ।



ପତ୍ର ଦାଗ: ଏହି ରୋଗ କବକ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ, ଏହା ହେଲେ ପତ୍ରରେ ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ ଓ ଗୁରୁତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପତ୍ର ଅକାଳରେ ଝଡ଼ିଯାଏ । ନିମ୍ନ ତେଲ ୫ ମିଲି ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥାଏ ।



କୋଲାଉ ରଟ୍ ବା କାଣ୍ଡ ପଟା ରୋଗ : ଏକ ବିନାଶକାରୀ କବକ ରୋଗ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଟିର ପାଖାପାଖି ଗଛର କାଣ୍ଡ ବା ଲତା ପଟି ଯାଇଥାଏ ଓ ତଳ୍ଲ ମରିଯାଏ । ଫଳରେ ଉତ୍ପାଦନ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ କମିଯାଏ । ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ହାତିଖଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ।



(4)

ଶୁଷ୍କ ପତା ରୋଗ : ଏହା କବକ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, ଏଥିରେ କନ୍ଦର କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କନ୍ଦରେ କଳା କଳା ଶୁଷ୍କ ପତା ଦାଗସବୁ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ । ଫଳରେ ଆଳୁର ବଜାର ଚାହିଦା କମିଯାଇଥାଏ ।



ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ : ଭୂତାଣୁ ବା ଭାଇରସ୍ ରୋଗ ହେଲେ ପତ୍ର ବିକୃତ, କୁଞ୍ଚିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନେକ୍ରୋସିସ୍ ବା କଳା ଦାଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି । ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଏପ୍ରିଲ୍ ଏବଂ ମିଲିବର୍ ଉଲି ଶୋଷକ ପୋକ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ । ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ନିମାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

କୀଟପତଙ୍ଗ

କେମାଟୋଡ୍ : ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅନିଷ୍ଟକାରକ ଅଟେ ଯାହା କନ୍ଦର କୋଷକୁ କ୍ଷତି ପଞ୍ଚିଇଥାଏ ଏବଂ କନ୍ଦରେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏହା ଚେରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲାକାର ଗଣ୍ଡି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଆନ୍ତି । ପ୍ରତି ଗାତ ୨୦୦ରୁ ୩୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ନିମ୍ନ ପିତିଆ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ଏହାର ପ୍ରାର୍ତ୍ତୁଭାବ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ।

ଯାମ୍ ବିଟଲ୍ : ବୟସ୍କ ବିଟଲ୍ ବା ପୋକ ମାଟିରେ ଗାତ କରି ରାହିଥାନ୍ତି । ପତ୍ରକୁ କଣା କରି ଏବଂ କନ୍ଦକୁ କଣା କରି ଖାଇଥାନ୍ତି । ଫଳରେ କନ୍ଦରେ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଓ ପରେ ପରେ କନ୍ଦଟି ପଟି ଯାଇଥାଏ । ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯିବା ସହ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି । ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ନିମାସ୍ତ୍ର ବା ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ।



(5)

ମିଲିବର୍ : ଏହି କୀଟପତଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଗଛର ପତ୍ର ଓ ଲତାରୁ ରସ ଶୋଷି କୁ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ଗଛ ରୋଗିଣୀ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଭାଇରସ୍ ଜନିତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ । ପତ୍ରରେ ସର୍ପି ମିଶ୍ରିତ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇପାରେ ବା ପାଉଁଶ ଛିଞ୍ଚା ଯାଇପାରେ ।



ପତ୍ର କାଟିବା ପିମ୍ପୁଡ଼ି : ଏହି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପତ୍ର ଓ ଲତା କାଟି ଗଛକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି ।

ଆଫିଡ୍ : ଏମାନେ ଖମ୍ବୁଆଳୁର ବିଭିନ୍ନ ଭାଇରସ୍ ରୋଗର ବାହକ ଅଟନ୍ତି । ଏମାନେ ପତ୍ର, ଲତା ଓ ଡଳର ରସ ଶୋଷି ଖାଇଥାନ୍ତି ।

ଅମଳ- ଏହାର ହାରାହାରି ଅମଳ ଏକର ପ୍ରତି ୮ ରୁ ୧୦ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।



ଭନ୍ନତ ପ୍ରଶାଳୀରେ ଖମ୍ବୁ ଆଳୁ ଗୁଣ



ହାର୍ଡିଫି ବୋର୍ଡ କୋଲ୍ଡନ, ପୋ/ଜିଲ୍ଲା-ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶା
ପିନ୍- ୭୬୫୦୦୧
ଫୋନ୍ ନଂ- ୦୬୮୫୭-୩୫୯୮୩୮

e-mail-shaktiorg@gmail.com,
www.shaktiorg.com
http://shaktiorg.blogspot.in