

(1)

ପୋଟଳ ଗୋଟିଏ ସବୁ ଦିନ ଚାହିଁବା ଥିବା ପରିବା ଯାହାକି ଶୀତ ଦିନ ବ୍ୟତୀତ ବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଋତୁରେ ମିଳିଥାଏ । ଏହାର ବଜାର ଦର ସବୁବେଳେ ଚଢ଼ା ରହିଥାଏ । ଏହାର ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ଭରପୁର ଥାଏ । ଏଥିରେ ୨% ପ୍ରୋଟିନ୍, ୦.୩% ଫ୍ୟାଟ୍, ୨.୨% ଶ୍ୱେତସାର, ଭିଟାମିନ୍ କ , ଭିଟାମିନ୍ ଗ ଇତ୍ୟାଦି ମିଳିଥାଏ । ଏହା ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ , ମସ୍ତିଷ୍କ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ଓ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହାର ଫଳକୁ ତରକାରୀ, ଭଜା ଓ କେତକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଚାର ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

ଜଳବାୟୁ

ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ଉଷ୍ମ ଓ ଆଦ୍ର ଜଳବାୟୁରେ ଭଲ ବଢ଼ିଥାଏ । ଶୀତ ଦିନରେ ଏହା ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଯାଏ । ୩୦-୩୫ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏହା ଭଲ ବଢ଼ିଥାଏ । ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁ ପୋଟଳ ଚାଷ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ ।

ମୃତ୍ତିକା

ବାଲିଆ, ଦୋରସା ଓ ନିଗିଡ଼ା ମାଟି ଏହା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ । ମାଟିରେ କୌଣସି ସମୟରେ ପାଣି ଜମା ହୋଇ ରହୁ ନ ଥିବା ଦରକାର । କ୍ଷାରୀ ଓ ଅମ୍ଳ ମାଟିରେ ଏହା ଭଲ ବଢେ ନାହିଁ ।

କ୍ଷମ

ସ୍ୱର୍ଣ ଅଲୌକିକ – ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ, ଈଷତ ପାଉଁଶିଆ, ୫-୮ ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବ, ଚାଣ ଓ ପତଳା ଚୋପାଯୁକ୍ତ, ଏକର ପ୍ରତି ୭୦୦୦ ରୁ ୮୦୦୦ କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ମିଳିଥାଏ ।

ଅର୍ଚ ନୀଳାଚଳ କୀର୍ତ୍ତୀ- ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ, ବର୍ତୁଳାକାର, ସବୁଜ ଗାରଯୁକ୍ତ , ଏକର ପ୍ରତି ୭୦୦୦ ରୁ ୮୦୦୦ କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ମିଳିଥାଏ।

ବଂଶ ବିସ୍ତାର

ଏକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଲତାକୁ ବା କାଣ୍ଡକୁ କାଟି କିମ୍ବା ସୁସ୍ଥ ଗଛରୁ ସଂଗୃହିତ ଗୁଚ୍ଛ ଶାଖା ମୂଳକୁ ଚାରା ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହାକୁ ନଭେମ୍ବର କିମ୍ବା ଡିସେମ୍ବରରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ । ଏହାର ମଞ୍ଜିରୁ ଚାରା କର ଯାଇ ନ ଥାଏ କାରଣ ଏଥିରୁ କେଉଁଟା ମାଛ କିମ୍ବା କେଉଁଟା ଅଣ୍ଟିରା ଗଛ ହେବ, ତାହା ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣା ପଡି ନଥାଏ ।

ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି

ଜମିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ୨-୩ଥର ହଳ କରି ମାଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୁଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ।

(2)

ହୁଡ଼ା ବା ବେଡ ପ୍ରସ୍ତୁତି

୪ ଫୁଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ୧ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚା ଓ ୨ ଫୁଟ ଚଉଡ଼ାର ଶଯ୍ୟା ବା ବେଡ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ।

ଖତ ଓ ସାର ପ୍ରୟୋଗ

ଚଉଡ଼ା ଶଯ୍ୟାରେ ବା ବେଡ୍‌ରେ ୫ଫୁଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ୧ଫୁଟ X ୧ଫୁଟ X ୧ଫୁଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାତ ଖୋଳି ସେଥିରେ ୧୦-୧୫ କେଜି ସଜା ଗୋବର ଖତ ଓ ୧କେଜି ଘନ ଜୀବାମୃତ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ୨୫- ୫୦ ଗ୍ରାମ୍ ମିଶ୍ରିତ ଅଣୁସାର ଦେଲେ ଭଲ । ଏ ସବୁ ନ ମିଳିଲେ ଗୋବର ଖତ ସହ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ଡିଏପି ଓ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ପଟାସ ସାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ ।

ରୋପଣ ସମୟ: ଚାରା ରୋପଣର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ହେଉଛି ଜୁନ୍-ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବର ।

ପୁରୁଷ-ସ୍ତ୍ରୀ ଗଛର ଅନୁପାତ: ସ୍ତ୍ରୀ ଗଛରୁ ଭଲ ଅମଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ୧୦ ମାଛ ଚାରା ପ୍ରତି ୧ଟି ଅଣ୍ଟିରା ଚାରା ଲଗାଇବା ଜରୁରୀ ।

ଜଳସେଚନ

ପ୍ରଥମ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା: ଲଗାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜଳସେଚନ : ଶୀତ ଦିନେ ୭-୧୦ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଓ ଖରା ଦିନେ ୪-୫ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜମିର ବତର ବା ଓଲ ଦେଖି ପାଣି ମଡ଼ାନ୍ତୁ।

ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ: ଉଚ୍ଚା ଶଯ୍ୟାରେ ଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ କରିବା ଭଲ।

ଗଛ ଲଗାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ

ଗଛ ଲଗାଇବାର ୩୦ ଦିନ ପରେ ୧ ଲିଟର ଜୀବାମୃତ ମାଟିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ । ଏହା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୨୧ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁନଃ ପୁନଃ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ । ଯଦି ମାଟିରେ ଅଣୁସାର ଚାଷ ସମୟରେ ଦିଆ ଯାଇନଥାଏ ଓ ଅଣୁ ସାରର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ୭୫-୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକସ୍ ବା କାଲ୍‌ବୋର୍ ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଗଛରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜମିରେ ବତର ଥିବା ସମୟରେ ଗଛରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଘାସ ଲତା ଓ ବାଲୁଙ୍ଗା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପରିଚାଳନା

ବର୍ଷା ଦିନେ ଧାତି ମଧ୍ୟରେ ହାତରେ ବା ଖୀଡ଼ର ଚଳାଇ ଘାସ ବଛାବଛି କରାଯାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ଘାସ ଲତାକୁ ହାତରେ ବଛା ଯାଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବେଡ୍ ଉପରେ ଜରି ମଡ଼ାଇ

(3)

(ମଲଟିଙ୍ଗ୍) ଘାସ ଲତା ଦମନ କରାଯାଇପାରେ । ଅନ୍ୟଥା ନଡ଼ା, ଶୁଖିଲା ଡାଳ ପତ୍ର ବା ଶୁଖିଲା କଦଳୀ ପତ୍ର ବେଡ୍ ଉପରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଘାସ ଲତା ଦମନ କରାଯାଇପାରେ ।

ଗଛ କାଟିବା

ଶୀତ ଦିନେ (ଅକ୍ଟୋବର – ଡିସେମ୍ବର) ଫଳ ସରିଲା ପରେ ଓ ଡଙ୍କ ଶୁଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭହେଲେ, ଗଛର ମୂଳକୁ ମାଟି ଠାରୁ ୨-୫ ଇଞ୍ଚ ରଖି କାଟି ଦେଇ ଜମିରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି କଟା ଡଙ୍କକୁ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ । କଟା ଯାଇଥିବା ମୂଳରୁ ନୂଆ ଶାଖା ଓ ଡଙ୍କ ବାହାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ଡଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ୧.୫-୨ ଫୁଟ ହୋଇଗଲେ ମାଟି କୋଡ଼ାଖୁସା କରି ଆଗରୁ ବର୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ଅନୁସାରେ ଖତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ।


ରୋଗ ଓ ପୋକ ପରିଚାଳନା

ଝାଉଁଳା ରୋଗ

ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ଗଛଟି ହଠାତ ଝାଉଁଳି ଯାଏ ଓ ପରେ ପରେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହଳଦିଆ ପଡିଯାଏ। ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଜମିଲେ ଓ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ନ ହେଲେ ଏହି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ । ହାଣ୍ଡି ଖତ ଓ ନିମାସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏଥିରୁ ଉପସମ ମିଳିଥାଏ । ଅନ୍ୟଥା ବାଭିଷ୍ଟିନ୍ ୧.୫ଗ୍ରାମ୍/ ୧ ଲିଟର ପାଣି , କାପଟାନ୍ ୨ଗ୍ରାମ୍/ ୧ ଲିଟର ପାଣି ହିସାବରେ ସିଂଚନ କଲେ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ ।

ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ

ଗଛର ପତ୍ରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ ଯାହା ପରେ ପରେ ବଡ ବଡ ହୋଇ ବାଦାମି ଓ କଳା ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତନ ହୋଇଥାନ୍ତି । ହାଣ୍ଡି ଖତ ଓ ନିମାସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏଥିରୁ ଉପସମ ମିଳିଥାଏ । ଡିଥେନ୍ ଏମ୍ ୪୫ ୨ଗ୍ରାମ୍/୧ ଲିଟର ପାଣି ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ ।



(4)

ପାଉଡରି ମିଲଡିଜ

ପତ୍ରରେ ଧଳା ଧଳା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଲାକାର ଆକୃତିର ଦେଖାଯାଏ ଓ ପତ୍ରଟି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବାଦାମି ରଙ୍ଗ ହୋଇ ଶୁଖିଯାଏ ଓ ମରିଯାଏ । ରିଡୋମିଲ୍ ୨.୫ ମିଲି/ ଲିଟର ପାଣି ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ ।



ମୋଜାଇକ ବା ସାହେବୀ ରୋଗ

ପତ୍ରରେ ସବୁଜ ଓ ହଳଦିଆ ଦାଗ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଅମଳ କମି ଯାଇ ଥାଏ । ନିମାସ୍ତ ଗଛ ପତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏଥିରୁ ଉପସମ ମିଳିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତିତ ମାଲ୍ୟୁୟନ୍ ୨ମିଲି/୧ଲିଟର ପାଣି ବା ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ୪ମିଲି /୧୦ ଲିଟର ପାଣି ହିସାବରେ ମିଶାଇ ଗଛରେ ସିଂଚନ କରାଯାଇପାରେ ।



ଲାଲ କଖାରୁ ପୋକ

ବୟସ୍କ କୀଟ ପତ୍ରକୁ ଗୋଲାକାରରେ କାଟି ଖାଇଥାଆନ୍ତି । ନିମାସ୍ତ ଗଛ ପତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏଥିରୁ ଉପସମ ମିଳିଥାଏ । ସେଭିନ୍ ବା କାର୍ବାରିଲ୍ ୨ଗ୍ରାମ୍/୧ଲିଟର ପାଣି ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ ।



ଗଣ୍ଡି ବିନ୍ଧା ପୋକ

ଏହି ପୋକଟି ଡାଳ କଣା କରି ପଶି ଗଣ୍ଡି ଆଡକୁ ଆଗେଇଥାଏ । କଣା ହୋଇଥିବା ଜାଗାରେ ଅଠାଳିଆ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଜମା ହୋଇଥାଏ । ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବୟସ୍କ ଗଛ ନ ମରିଲେ ମଧ୍ୟ ଫସଲର ଅମଳ କମି ଯାଇଥାଏ । ଫେନଥାଲେରେଟ୍ କୀଟନାଶକ ୨ମିଲି / ୧ ଲିଟର ପାଣି ହିସାବରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରାଯାଇଥାଏ । ଧୂଆଁ ପତ୍ର ପାଣି ସିଂଚନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ।


(5)

ଫଳ ମାଛି

ଏହି ମାଛିର ଶୁକ ଫଳକୁ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ । ଏହା ଏକ ମାରାତ୍ମକ ପୋକ ଅଟେ । ଏକର ପ୍ରତି ୪-୫ଟି ଫେରୋମନ୍ ଯନ୍ତ୍ରା ବସାଇବା ଦରକାର । ୨ମିଲି ମାଲ୍ୟୁୟନ୍ ୧୦ଗ୍ରାମ୍ ଗୁଡ ଓ ୧ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇ ଏକ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏଥିରୁ କିଛି ମାତ୍ରା ଚଟକା ପାତ୍ରରେ ଜମି ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲେ ମାଛିଗୁଡ଼ିକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଏହା ଖାଇ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି ।

ଲାଲ ବୁଡିଆଣୀ ମାଇଟ

ଏମାନେ ପତ୍ର ଓ ଡାଳରେ ଜାଲ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଓ ପତ୍ରର ତଳ ପଟେ ରହି ରସ ଶୋଷୀ ଖାଇଥାନ୍ତି । ଫଳରେ ପତ୍ରଟି ମୋଟା ହୋଇ ମରି ଯାଇଥାଏ । ନିମ୍ନ ତେଲ ୫ମିଲି/୧ଲିଟର ପାଣି ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ । ଡାଇକୋଫଲ୍ ୨-୩ ମିଲି/୧ ଲିଟର ପାଣି ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ ।



ଚେର ଗଣ୍ଡି ନେମାଟୋଡ

ଏହି ନେମାଟୋଡ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଚେରରେ ସବୁଗଣ୍ଡି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଗଛର ବୃଦ୍ଧି କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ଗଛର ପତ୍ର ଛୋଟ ଓ ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ । ତଳଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖି ଯାଇଥାନ୍ତି । ଗଛ ଲଗାଇବା ବେଳେ ଗତ ପ୍ରତି ୫୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ନିମ୍ନ ପିଡିଆ ଦେଲେ, ଏହାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗାତ ପ୍ରତି ପୁରାଡୋନ୍ ବା କାର୍ବୋପୁରାନ୍ ଦାନା ୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦେଇ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ନେମାଟୋଡ ଆକ୍ରମଣ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ।

ପୋଟଳ ଅମଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କିଛି ସୂଚନା

ଉପଯୁକ୍ତ ବାୟୁ ସମ୍ପାଳନ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପାଇଁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋତମ ବ୍ୟବଧାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ । ମାଲ ଗଛ ଓ ଅଣ୍ଡିରା ଗଛର ଅନୁପାତ ୧୦: ୧ ରଖନ୍ତୁ । ଅର୍ଥାତ ୧୦ଟି ମାଲ ଗଛରେ ୧ଟି ଅଣ୍ଡିରା ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ । ଟ୍ରେଲିରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଡାନ୍ତୁ । ମାଟିରେ ମଡାନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଅଣ୍ଡି ସାରର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଜମିରେ ବତର ଦେଖି ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣିର ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ଜରି ବା ଶୁଖିଲା ଘାସ କୁଟା ଦ୍ୱାରା ମଲଟିଙ୍ଗ ବା ଆଛାଦନ କରନ୍ତୁ । ପରାଗ ସଂଗମ ପାଇଁ କିଜଳି ଅଧିକ ମହୁମାଛି, ଭଅଁର ସବୁ ଆସିପାରିବେ, ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ । ସମନ୍ୱିତ କୀଟପତଙ୍ଗ ପରିଚାଳନା କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିୟମିତ ଭାବରେ କୀଟପତଙ୍ଗ ନିରାକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ ।



ଭନ୍ନତ ପ୍ରଶାଳୀରେ ପୋଟଳ ଗୁଣ



ହାର୍ଡ଼ୱେ ବୋର୍ଡ କୋଲ୍‌ନୀ, ପୋ/ଜିଲ୍ଲା-ରାୟଗଡା, ଓଡ଼ିଶା

ଫିନ୍- ୨୭୫୦୦୧

ଫୋନ୍ ନଂ.- ୦୬୮୫୭-୩୫୯୮୩୮

e-mail-shaktiorg@gmail.com,

www.shaktiorg.com

http://shaktiorg.blogspot.in